

Odontoma expansivo em ângulo mandíbular – Relato de Caso

Renato Torres Augusto NETO, Deborah Laurindo Pereira SANTOS, Luiz Henrique Soares TORRES,
Eduardo Santana JACOB, Raphael DE MARCO, Luiz Fernando de Oliveira GORLA,
Marisa Aparecida Cabrini GABRIELLI, Valfrido Antonio PEREIRA-FILHO

Os odontomas são os tumores odontogênicos benignos mais comuns, resultante da má formação dos tecidos odontogênicos duros e moles, são comumente categorizados como hamartomas odontogênicos (OH). Os OH são frequentemente assintomáticos, sendo normalmente diagnosticados em radiografias de rotina. Acometem indivíduos nas primeiras duas décadas de vida e não têm predileção por gênero. A etiopatogenia não é completamente compreendida e o tratamento é geralmente o mais conservador possível, a depender do local e extensão da lesão. O relato de caso discorre sobre uma paciente de 20anos, que apresentava lesão expansiva em ângulo mandibular, com diagnóstico provável de odontoma associado ao elemento dentário 47 incluso, a lesão se estendia por quase toda altura do ângulo mandibular direito. O tratamento de escolha foi a cirurgia para exérese da lesão, remoção do elemento incluso associado e fixação da mandíbula com uma placa de reconstrução previamente modelada em biomodelo, a fim de evitar um a possível fratura patológica no período pós-operatório.

DESCRITORES: Odontoma; Reconstrução Mandibular; Hamartoma